

SMERNICE ZA CEPLJENJE PSOV

**PASJA KUGA
PARVOVIROZA
ADENOVIRUSNI HEPATITIS**



**NUJNO
CEPLJENJE**

1. CEPLJENJE

mladič < 16 tednov

pri 8 tednih

po 4 tednih

pri vsaj 16 tednih

psi > 16 tednov

enkratno začetno cepljenje

PONOVITEV CEPLJENJA

po 6–12 mesecih



nato **NE POGOSTEJE** kot vsake 3 leta
ali preverjanje ravni specifičnih protiteles



STEKLINA

1. CEPLJENJE

med 12 in 16 tedni starosti

PONOVITEV CEPLJENJA

drugo in tretje cepljenje v razmikih do 12 mesecev
od predhodnega cepljenja*

nato po navodilih proizvajalca

**PO ZAKONU
OBVEZNO
CEPLJENJE****



* Če drugo, tretje ali nadaljnje cepljenje ni izvedeno v rokih, se cepljenje po prekinitvi šteje kot prvo (primarno) cepljenje. Dve zaporedni cepljenji ne smeta biti opravljena v istem koledarskem letu.

** Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline (Uradni list RS, št. 98/13 in 81/16)

LEPTOSPIROZA

**PRIPOROČLJIVO
CEPLJENJE**
glede na
življenjski slog
psa

1. CEPLJENJE

po 8 tednih starosti
ne glede na starost psa
ali kadar zgodovina cepljenja ni znana ali popolna

dva zaporedna odmerka
v razmiku 2–4 tedne

PONOVITEV CEPLJENJA

po 12 mesecih


nato vsakih 12 mesecev



POMEMBNO JE VEDETI

**Cepljenje ponovimo vedno
z istimi serovari***

Če uporabimo cepivo z drugimi serovari,
moramo psa ponovno cepiti 2x zapored
z novimi serovari ne glede na starost živali.
Za imunost morata biti vedno dva začetna
zaporedna odmerka z istimi serovari –
ni navzkrižne zaščite pred
različnimi serovari
leptospire.



*antigenska različica bakterije leptospire

Podrobneje



bit.ly/WSAVAvacc
WSAVA



bit.ly/AAHAVacc
AAHA



Veterinarska zbornica
Slovenije